

SABOTAGE-ANTI-MEDIKAMENTE

MEDIKAMENT BEI DOSIERUNG

Sanasthmax (Beclametason)	Lungenreizstoffen (Kratzen im Hals, Hustenreiz)	5 Hübe alle 10 Minuten bis zum Verschwinden aller Symptome
Kohle-Pulvis Einmalbecher 10Gramm, Fa-Dr.Köhler, Alsbach	verschluckte Gifte, Bakterien (Milzbrand), Viren	bei geringstem Verdacht sofort pro Person einen Becher trinken, evtl. Wiederholung täglich (Becher bis zum Strich mit Wasser o.a.füllen, verschliessen,schütteln)
Doxycyclin 200	Bakterien wie Milzbrand, Brucellosen, Clostr.perfr., (Gasbrand), Pest	2x1 Tbl., in schweren Fällen bis 6stdl. 1Tbl.
Alternative: Ciprofloxacin TAD 200 mg	wie Doxycyclin	nur, falls obige Keime auf Doxycyclin resistent sind 2 x 1 Tbl, in schweren Fällen bis 2 x 500 mg
Haes 6% 500 ml	Schock durch alle Katastrophengifte und Panikreaktion, vom Arzt oder Rettungsassistenten anlegen lassen	da im Katastrophenfall nicht genügend Material bereit steht, kann man mit dem vorrätig gehaltenen Blutersatz selbst gerettet werden (Vorrat im Auto,Geschäft)

weitere Gegengifte, wenn ein neues Sabotagegift verwendet wurde.

Unterstützende **Medikamente aus der Hausapotheke:**

Zink (Unizink, Köhler Chemie)	immunschädigende Sabotagegifte insb. Metalle, Viren, Bakterien	0-2-4 Drg. nüchtern, bei Überdosierung
-------------------------------------	---	---

Prophylaxe:

Keine allergisierenden Stoffe im Mund und in der Wohnung, die das Immunsystem stören (Langzeit Haut-Allergietest über 7 Tage), viel Leitungswasser trinken, Bewegung an der frischen Luft.