

Protirelin

5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-prolinamid

Handelspräparate:

HenningBerlin:

Antepan

Hoechst Marion Roussel:

Relefact TRH

Merck:

Thyroliberin

Berlin-Chemie:

TRH Berlin-Chemie

Ferring Arzneimittel:

TRH Ferring

Vorkommen im Trinkwasser:

Über den Urin der Anwender gelangen alljährlich große Mengen der Reinsubstanz über das Abwasser in das Grundwasser und von dort in manches Trinkwasser.

Indikationen:

TRH-Test zur Differentialdiagnose von Schilddrüsenfunktionsstörungen.

Kontraindikationen:

Akuter Herzinfarkt, Instabile Angina pectoris, Erhöhte Krampfbereitschaft, Schwere obstruktive Bronchialerkrankungen

Toxizität:

Nebenwirkungen:

Haut:

Wärme- und Hitzegefühl

Muskel u. Skelett:

Mißempfindungen in den Extremitäten

Nervensystem:

Benommenheit

Kopfschmerzen

Krampfanfälle b. Patienten mit erhöhter Krampfbereitschaft

Geschmack:

Ungewöhnliche Geschmacksempfindungen

Gastrointestinaltrakt:

Übelkeit, Erbrechen,

Mißempfindungen im Bereich der Abdominal- und Beckenorgane

Hungergefühl

Mundtrockenheit

Herz, Kreislauf:

Tachykardie

Blutdruckanstieg

Orthostatische Regulationsstörungen

Angina-pectoris-Beschwerden

Atemwege:

Asthmaanfall b. Asthmatikern

Mißempfindungen in der Brust

Urogenitaltrakt:

Harndrang

Immunsystem:

Überempfindlichkeitsreaktionen bis zum Schock

Therapie:

Bei Überdosierung Überwachung, Theophyllin bei Asthma.