

# Fenetyllin

**Synonyma:**

N-[ $\beta$ -(7-Theophyllinyl)-ethyl]-amphetamin; (RS)-1,3-Dimethyl-7-[2(a-methylphenethylamino)ethyl]-2,6-(1H,3H)-purindion

**Vorkommen:**

Captagon Filmtabletten, Asta Medica

**Verwendung:**

Psychoanaleptikum

**Symptome:**

Unruhe, Angstgefühl, Harndrang, zentrale Erregung, psychische Alterationen, Tremor der Hände, zentrale und myogene Tachykardie, Blutdruckanstieg, Extrasystolie, Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Fieber, illusionäre Verkennungen, optische und akustische Halluzinationen, Krämpfe, Hyperthermie, Herz- und Kreislaufkollaps, Atemlähmung. Amphetamin-Abhängigkeit.

**Therapie:**

Bei Überdosierung sofort Kohle-Pulvis, Klinikeinweisung unter Monitorkontrolle, Magenspülung, Kohle, Monitorkontrolle.

Plasmaexpander. Bei anticholinergem Wirkung Antidot Physostigmin (Anticholinum 2 mg, Wiederholung)

Bei Amphetaminentzug steht ein Dauerschlaf abgelöst von Heißhunger im Vordergrund. Schutz vor Selbstmordgefahr (Bezugsperson).