

Medikamente

Nicotinsäure

Synonym:

3-Pyridincarbonsäure

Handelspräparate:

Medopharm:

Antisklerosin S Dragees (Komb)

Merz&Co.:

Merz Spezial Dragees SN (Komb)

Vorkommen im Trinkwasser:

Über den Urin der Anwender gelangen alljährlich große Mengen der Reinsubstanz über das Abwasser in das Grundwasser und von dort in manches Trinkwasser.

Indikation:

Hoher Blutfettspiegel.

Kontraindikation:

Akute Herz-Kreislauf-Insuffizienz.

Toxizität:

Nebenwirkungen:

Haut: Flush (mit Pruritus, z.T. Urtikaria); Hauttrockenheit (Langzeitbehandlung in hoher Dosierung); Hyperkeratosen (Langzeitbehandlung in hoher Dosierung); braune Hyperpigmentierung bis zu Acanthosis-nigrans-ähnlichen Symptomen (Langzeitbehandlung in hoher Dosierung)

Augen: toxische Makulaveränderungen (mit Minderung des Sehvermögens, Kopfschmerzen, Verwirrheitszuständen) (Einzelfälle)

Gastrointestinaltrakt: gastrointestinale Störungen (z.B. Sodbrennen, Appetitlosigkeit, Völlegfühl, Hyperazidität, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö) (Langzeitbehandlung in hoher Dosierung); peptische Ulzera (Einzelfälle bei Langzeitbehandlung in hoher Dosierung)

Leber: Leberfunktionsstörungen (Langzeitbehandlung in hoher Dosierung)

Stoffwechsel: verminderte Glucosetoleranz, Anstieg des Nüchternblutzuckers (Langzeitbehandlung in hoher Dosierung); Anstieg des Harnsäurespiegels (bei Gichtdisposition), Gichtanfälle (Langzeitbehandlung in hoher Dosierung)

Herz: Arrhythmieineigung (bei Patienten nach Myokardinfarkt)

Therapie:

Bei Überdosierung sofort Kohle-Pulvis, Klinikeinweisung unter Monitorkontrolle, Magenspülung, Kohle, Plasmaexpander.