

Triflupromazin



Chemische Formel:



Vorkommen:

Psyquil® (Heyden)

Zus.: 1 Drg. enth.: Triflupromazin-HCl 10/25/50 mg; Supp.: 70 mg Triflupromazin-Base; Amp.: 10 mg/20 mg Triflupromazin-HCl.

Dosierung: ED Erw. 10–25 mg, TMD Erw. 50-200 mg.

Indikationen: Agitierte Psychosen, psychomotorische Erregungszustände, Erbrechen, Pruritis.

Wirkungscharakter:

Phenothiazin, antipsychotische Wirkung (Potenz 2–4x so stark wie Chlorpromazin), deutliche Sedierung, gute antiemetische Wirkung, gute Antihistaminwirkung.

Nebenwirkungen: Extrapyramidale Symptomatik, Blutdruck-Abfall

Symptome:

- im Vordergrund stehen Bewußtseinsstörungen (Verwirrtheit, Somnolenz, Koma)
- extrapyramidale Symptome
- Krämpfe
- Atemdepression
- Hypertonie
- Arrhythmie

Zeitlicher Ablauf:

Auftreten der ersten Symptome:

bei parenteraler Gabe etwa nach ½ h

bei oraler Gabe nach ¾ h

bei rektaler Gabe nach 2 h

Vollbild der Symptomatik nach etwa 18 h

Nachweis:

qual.: Dünnschichtchromatografie; quant.: Gaschromatografie

Therapie:

- primäre Giftentfernung: Kohle-Pulvis-Gabe, Magenspülung, Kohle, Glaubersalz
- sekundäre Giftentfernung: ohne Erfolg
- bei extrapyramidaler Symptomatik: Biperiden (0,04 mg/kg KG)
- bei Hypotonie: Plasma(expander)gabe
- bei Tachyarrhythmien: Lidocain
- bei zentralanticholinergen Symptomen wie Erregungen, Krämpfen, Delirium, Desorientiertheit, Halluzinationen und Atemdepression Versuch mit Physostigmin (2 mg i.m. oder langsam i.v., Wiederholung bei Bedarf)