

## Urapidil

**Synonym:**

6-[3-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-propyl-amino]-1,3-dimethyluracil

**Handelspräparate:**

*OPW:*

Alpha-Depressan

*Byk Gulden:*

Ebrantil

**Vorkommen im Trinkwasser:**

Über den Urin der Anwender gelangen alljährlich große Mengen der Reinsubstanz über das Abwasser in das Grundwasser und von dort in manches Trinkwasser.

**Wirkungscharakter:**

Antihypertonikum

**Indikation:**

Bluthochdruck

**Kontraindikationen:**

Schwangerschaft, Stillzeit

**Toxizität:**

*Nebenwirkungen:*

Gelegentlich zu Beginn der Therapie vorübergehend als Folge der Blutdrucksenkung: Schwindelgefühl, Übelkeit u. Kopfschmerz. In seltenen Fällen Müdigkeit, Herzklopfen, gastrointestinale Beschwerden, Juckreiz, Schlafstörungen, Mundtrockenheit sowie orthostatische Dysregulation. Sehr selten allergische Hautreaktionen (Juckreiz, Hautrötung, Exantheme). In Einzelfällen verstärkter Harndrang o. Inkontinenz. In seltenen Einzelfällen in zeitlichem Zusammenhang Thrombopenie; kausaler Zusammenhang nicht nachgewiesen.

**Therapie:**

Bei Überdosierung sofort Kohle-Pulvis, Klinikeinweisung unter Monitorkontrolle, Magenspülung, Kohle, Monitorkontrolle. Plasmaexpander.